

PIENSO COMPLEMENTARIO LÍQUIDO PARA COMBATIR ESTADOS DE ESTRÉS Y COMPORTAMIENTOS INDESEADOS

Indicado en momentos de tensión, para emplear en momentos de estrés tanto en ganado porcino como en otras especies, ayudando a minimizar efectos indeseados asociados a dichos estados.



Composición: cloruro sódico, cloruro de magnesio, propilenglicol.

Aditivos: mezcla de aromatizantes (*Valeriana officinalis* y *Melissa officinalis*). Conservantes: ácido propiónico y propionato de amonio.

Especies de destino:


Porcino, equino y rumiantes.

Uso en porcino para:

- Reducir el estrés:
 - ocasionado por agrupación en parques de cerdas gestantes.
 - ocasionado por agrupación de lotes en cebo.
 - relacionado con la formación de jerarquía social en los momentos de agrupación de lotes.
- Reducir el riesgo de comportamientos no deseados como caudofagia y agresividad.
- Preparación para el transporte.
- Introducción y aclimatación de animales nuevos en la explotación.
- Favorecer la adaptación a espacios confinados como parideras, cebo.
- Suplir carencias alimenticias de minerales traza necesarios en períodos de estrés.
- Ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal en animales sometidos a estrés.
- Facilitar el manejo en reproductoras, ayudando a reducir el canibalismo y comportamientos indeseados.

Instrucciones de uso:

- **Porcino:**
 - Lechones: 10-20 ml/lechón/día
 - Cerdas gestantes: 30-40 ml/cerda/día durante 6 días (desde 3 días antes y hasta 3 días después de agrupar cerdas o de formar grupos de cerdas gestantes).
 - Cerdas madres: 30-50 ml/cerda/día durante 6 días (desde 3 días antes y hasta 3 días después del parto).
- **Equinos y rumiantes:** 50-60 ml/animal/día.



EFICACIA DE LIPTOTRAN L DURANTE EL PERIPARTO EN PORCINO

Prueba realizada en granja comercial en Navarra (España). Año 2016

- **OBJETIVO:** Evaluar los resultados zootécnicos en paridera de la utilización de **LIPTOTRAN L**.
- **DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA:**
 - se suministró 36 ml / cerda / día en agua de bebida.
 - desde 3 días antes del parto hasta 3 días después.



RESULTADOS ZOOTÉCNICOS DEL USO DE LIPTOTRAN L	
Nº Total de partos	1136
Época del año	Junio-Julio
Lechones Nacidos Vivos	↑ 8%
Lechones Nacidos Muertos	↓ 30%
Bajas en maternidad	↓ 36%
Bajas cerdas madre	↓ 37,5%

Conservación y almacenaje: almacenar en lugar fresco y alejado de la luz solar directa. Mantener los envases cerrados sin contacto con suelo o paredes.

Código: 155X

Envase: 5L y 25L.

Liptosa

...the green way of life



Para más información
escanea este código con
tu móvil